

NO smith&nephew

ACTICOAT° FLEX 7

with SILCRYST° Nanocrystals
Sølvbelagt, antimikrobielt beskyttelsesbandasje

Beskrivelse
ACTICOAT° Flex 7-bandasjen med antimikrobiell barriere består av et fleksibelt, lite klebende polyesterlag belagt med nanokrystallinsk sølv. ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er en svært føyeilig bandasje som følger kroppens konturer for å holde kontakt med sårlåten. Bandasjen er lite klebende, noe som bidrar til å minimalisere sårtrauma ved bandasjejkkift. Nanokrystallinsk sølv gir en effektiv antimikrobiell barriere mot mikrobiell kontaminasjon og beskytter såret mot invasive patogene mikroorganismer og bidrar dermed til raskere tilheling. Nanokrystallinsk sølv er også effektivt mot bakterieegenskaper til ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er effektiv i minst 7 dager.

Indikasjoner
ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er indisert som en antimikrobiell barriere-bandasje over enkle og kompliserte sår så som overflående vanner, operasjonssteder, trykksår, venøse sår og diabetologer. ACTICOAT° Flex 7-bandasjen kan brukes på infiserte sår. Når produktet brukes på infiserte sår, skal infeksjonen inspiseres og behandles i henhold til lokal klinisk prosedyre. ACTICOAT° Flex 7-bandasjen kan brukes som sårkontaklag i kombinasjon med sårbehandling med negativ trykk (NPWT) i en periode på opptil 3 dager.

Kontraindikasjoner
• Må ikke brukes på pasienter med kjent overfølsomhet for sølv.
• Må ikke brukes på pasienter under MR-undersøkelse (magnetisk resonanstomografi).
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen før strålebehandling. En ny bandasje kan påføres etter hver behandling.
Førholdsregler
• Kun for ekstern bruk. Bandasjen skal for eksempel ikke påføres på eksponerte organer.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke kompatibel med oljebaserte produkter som vaselin.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke nødvendigvis kompatibel med topiske antimikrobielle midler.
• Unngå kontakt med elektroder eller ledende geier under elektroniske målinger, f.eks. EEG og ECG.
• Midlertidig smerte kan opplevs ved påføring av ACTICOAT° Flex 7-bandasjen. Fjern bandasjen hvis vedvarende smerte opplevs etter påføring. For å lindre denne smerten påføres du en ny bandasje og bruker et hydrogelprodukt som absorberer smertefullt risiko. Det er ingen kjent risiko for allergi. Skulle smerten vedvare, fjern der bandasjen og opphør bruken.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen skal kun brukes på premature spedbarn mindre enn 37 ukers svangerskapsl når det kliniske utfyllet oppveier potensiel risiko. Det er ingen kjent risiko for allergi. Skulle smerten vedvare, fjern der bandasjen og opphør bruken.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen skal kun brukes på premature spedbarn mindre enn 37 ukers svangerskapsl når det kliniske utfyllet oppveier potensiel risiko. Det er ingen kjent risiko for allergi. Skulle smerten vedvare, fjern der bandasjen og opphør bruken.

Kontraindikasjoner
• Må ikke brukes på pasienter med kjent overfølsomhet for sølv.
• Må ikke brukes på pasienter under MR-undersøkelse (magnetisk resonanstomografi).
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen før strålebehandling. En ny bandasje kan påføres etter hver behandling.
Førholdsregler
• Kun for ekstern bruk. Bandasjen skal for eksempel ikke påføres på eksponerte organer.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke kompatibel med oljebaserte produkter som vaselin.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke nødvendigvis kompatibel med topiske antimikrobielle midler.
• Unngå kontakt med elektroder eller ledende geier under elektroniske målinger, f.eks. EEG og ECG.
• Midlertidig smerte kan opplevs ved påføring av ACTICOAT° Flex 7-bandasjen. Fjern bandasjen hvis vedvarende smerte opplevs etter påføring. For å lindre denne smerten påføres du en ny bandasje og bruker et hydrogelprodukt som absorberer smertefullt risiko. Det er ingen kjent risiko for allergi. Skulle smerten vedvare, fjern der bandasjen og opphør bruken.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen skal kun brukes på premature spedbarn mindre enn 37 ukers svangerskapsl når det kliniske utfyllet oppveier potensiel risiko. Det er ingen kjent risiko for allergi. Skulle smerten vedvare, fjern der bandasjen og opphør bruken.

Kontraindikasjoner
• Må ikke brukes på pasienter med kjent overfølsomhet for sølv.
• Må ikke brukes på pasienter under MR-undersøkelse (magnetisk resonanstomografi).
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen før strålebehandling. En ny bandasje kan påføres etter hver behandling.
Førholdsregler
• Kun for ekstern bruk. Bandasjen skal for eksempel ikke påføres på eksponerte organer.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke kompatibel med oljebaserte produkter som vaselin.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke nødvendigvis kompatibel med topiske antimikrobielle midler.
• Unngå kontakt med elektroder eller ledende geier under elektroniske målinger, f.eks. EEG og ECG.
• Midlertidig smerte kan opplevs ved påføring av ACTICOAT° Flex 7-bandasjen. Fjern bandasjen hvis vedvarende smerte opplevs etter påføring. For å lindre denne smerten påføres du en ny bandasje og bruker et hydrogelprodukt som absorberer smertefullt risiko. Det er ingen kjent risiko for allergi. Skulle smerten vedvare, fjern der bandasjen og opphør bruken.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen skal kun brukes på premature spedbarn mindre enn 37 ukers svangerskapsl når det kliniske utfyllet oppveier potensiel risiko. Det er ingen kjent risiko for allergi. Skulle smerten vedvare, fjern der bandasjen og opphør bruken.

Kontraindikasjoner
• Må ikke brukes på pasienter med kjent overfølsomhet for sølv.
• Må ikke brukes på pasienter under MR-undersøkelse (magnetisk resonanstomografi).
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen før strålebehandling. En ny bandasje kan påføres etter hver behandling.
Førholdsregler
• Kun for ekstern bruk. Bandasjen skal for eksempel ikke påføres på eksponerte organer.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke kompatibel med oljebaserte produkter som vaselin.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke nødvendigvis kompatibel med topiske antimikrobielle midler.
• Unngå kontakt med elektroder eller ledende geier under elektroniske målinger, f.eks. EEG og ECG.
• Midlertidig smerte kan opplevs ved påføring av ACTICOAT° Flex 7-bandasjen. Fjern bandasjen hvis vedvarende smerte opplevs etter påføring. For å lindre denne smerten påføres du en ny bandasje og bruker et hydrogelprodukt som absorberer smertefullt risiko. Det er ingen kjent risiko for allergi. Skulle smerten vedvare, fjern der bandasjen og opphør bruken.

Kontraindikasjoner
• Må ikke brukes på pasienter med kjent overfølsomhet for sølv.
• Må ikke brukes på pasienter under MR-undersøkelse (magnetisk resonanstomografi).
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen før strålebehandling. En ny bandasje kan påføres etter hver behandling.
Førholdsregler
• Kun for ekstern bruk. Bandasjen skal for eksempel ikke påføres på eksponerte organer.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke kompatibel med oljebaserte produkter som vaselin.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke nødvendigvis kompatibel med topiske antimikrobielle midler.
• Unngå kontakt med elektroder eller ledende geier under elektroniske målinger, f.eks. EEG og ECG.
• Midlertidig smerte kan opplevs ved påføring av ACTICOAT° Flex 7-bandasjen. Fjern bandasjen hvis vedvarende smerte opplevs etter påføring. For å lindre denne smerten påføres du en ny bandasje og bruker et hydrogelprodukt som absorberer smertefullt risiko. Det er ingen kjent risiko for allergi. Skulle smerten vedvare, fjern der bandasjen og opphør bruken.

Kontraindikasjoner
• Må ikke brukes på pasienter med kjent overfølsomhet for sølv.
• Må ikke brukes på pasienter under MR-undersøkelse (magnetisk resonanstomografi).
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen før strålebehandling. En ny bandasje kan påføres etter hver behandling.
Førholdsregler
• Kun for ekstern bruk. Bandasjen skal for eksempel ikke påføres på eksponerte organer.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke kompatibel med oljebaserte produkter som vaselin.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke nødvendigvis kompatibel med topiske antimikrobielle midler.
• Unngå kontakt med elektroder eller ledende geier under elektroniske målinger, f.eks. EEG og ECG.
• Midlertidig smerte kan opplevs ved påføring av ACTICOAT° Flex 7-bandasjen. Fjern bandasjen hvis vedvarende smerte opplevs etter påføring. For å lindre denne smerten påføres du en ny bandasje og bruker et hydrogelprodukt som absorberer smertefullt risiko. Det er ingen kjent risiko for allergi. Skulle smerten vedvare, fjern der bandasjen og opphør bruken.

FI smith&nephew

ACTICOAT° FLEX 7

with SILCRYST° Nanocrystals
Hopeapäälysteinen antimikrobinen estosite

Kuvaus
Antimikrobinen ACTICOAT° Flex 7 -sidos on tehnyt joustavasta, lähes haavaan tarttumatonasta polyesteristä, jossa on nanokidehoitosien pinnalla. ACTICOAT° Flex 7 -sidos on erittäin mukautuva sidos, joka myötäilee vartalon muotoja, jotta sidos pysyy kontaktissa haavojen kanssa. Sidos on lähes haavaan tarttumaton, mikä vähentää trauman sidoksen vaihtamisen yhteydessä. Nanokidehoitosien suojaa mikrokontaminaatiota vastaan, suojaten lähten haavaa nopeasti levittäviltä, tauteja aiheuttavilta mikro-organismeiltä, mikä nopeuttaa haavan parantumista. Nanokidehoitosien on tehokas myös jo haavassa esiintyvien mikro-organismien torjunnassa. ACTICOAT° Flex 7 -sidoksen antimikrobinen to sähly vähintään 7 päivän ajan.

Käyttöohjeet
• Tarvittaessa haava tulee puhdistaa paikallisen sairaalan klinisen protokollan mukaisesti. Keltäsuojaluokusta EI SAA käyttää.
• Poista ACTICOAT° Flex 7 -sidos pakkauksesta aseptisellä tekniikalla. Leikkaa sidos sopivan muotoiseksi. Kun sidosta käytetään kompressiohoidon kanssa, sidos tulee leikata haavain koksosel.
• Kostuta sidos kultaallaan sairaalan klinisen protokollan mukaisesti. Uputa se ensin lämpimään ja puuriista sitten kevyesti. Keltäsuojaluokusta EI SAA käyttää. Anna ylimääräisen veden valua pois ennen sidoksen asettamista. Vaihtohoitoksi voidaan levittää ohut kerros hydrogeeliä, kuten INTRASITE® Gel -tuotetta, suoraan haavapinnalle ja/tai sidokselle.
• Haavan välikamateriaali tulee kostuttaa ja vaihtaa valmistajan ohjeiden mukaan, kun sidosta käytetään haavan välikamateriaalin vaihtamisen kanssa. Hydrogeelin, kuten INTRASITE®n, käyttöä ei suositella silloin, kun ACTICOAT° Flex 7 -sidoksen kanssa käytetään alpainehoitajajärjestelmää.

Käyttöohjeet
• Tarkoitettu ACTICOAT° Flex 7 -sidos on tarkoitettu käytettäväksi antimikrobinen suojasidoksena pinnallisella tai syvillä ihovaurioilla, kun palovammoille, leikkauksilla, painaavilla, haavaperäisillä haavoilla sekä diabeettisella haavatuella. ACTICOAT° Flex 7 -sidosta voidaan käyttää tulehtuneisiin haavoihin. Kun tuotetta käytetään tulehtuneissa haavoissa, alpainehoitajajärjestelmää ja hoidettavaa sairaalan klinisen protokollan mukaan. ACTICOAT° Flex 7 -sidosta voidaan käyttää alpaineta hyödyntävän haavahoitajajärjestelmän kanssa enintään 3 päivän ajan.

Vaestöohjeet
• Ei saa käyttää potillailla, joilla on todettu yllerkkyys hopealle.
• Ei saa käyttää potillailla magneettiresonansskuvantamisen (MRI) yhteydessä.
• Poista ACTICOAT° Flex 7 -sidos ennen sädehoitoa antamista. Sidos voidaan vaihtaa uuteen kunakin hoidokerran päätyttyä.
• Pöör ACTICOAT° Flex 7-bandasjen på säröverletten med valgrin side opp uten å strekke bandasjen, og sørg for at det ikke er noen foldet. Bandasjen skal påføres med strekketreting langs lemmet for å tillate bevegelse.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen kan brukes til å pakke sår.
• Fest ACTICOAT° Flex 7-bandasjen med en egnet sekundær bandasje eller kompresjonsbehandling som vil oppretholde et fuktig miljø. Ved svært væskeende sår bør det brukes en absorberende sekundær bandasje.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen tillater transport av eksudatet direkte til den sekundære bandasjen.
• Hold ACTICOAT° Flex 7-bandasjen lukket, med ikke så våt at det oppstår maserasjon av vev.
• Skift bandasjen avhengig av mengden eksudat og sårets tilstand. La bandasjene være på plass i opptil 7 døg.

Kontraindikasjoner
• Må ikke brukes på pasienter med kjent overfølsomhet for sølv.
• Må ikke brukes på pasienter under MR-undersøkelse (magnetisk resonanstomografi).
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen før strålebehandling. En ny bandasje kan påføres etter hver behandling.
Førholdsregler
• Kun for ekstern bruk. Bandasjen skal for eksempel ikke påføres på eksponerte organer.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke kompatibel med oljebaserte produkter som vaselin.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke nødvendigvis kompatibel med topiske antimikrobielle midler.
• Unngå kontakt med elektroder eller ledende geier under elektroniske målinger, f.eks. EEG og ECG.
• Midlertidig smerte kan opplevs ved påføring av ACTICOAT° Flex 7-bandasjen. Fjern bandasjen hvis vedvarende smerte opplevs etter påføring. For å lindre denne smerten påføres du en ny bandasje og bruker et hydrogelprodukt som absorberer smertefullt risiko. Det er ingen kjent risiko for allergi. Skulle smerten vedvare, fjern der bandasjen og opphør bruken.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen skal kun brukes på premature spedbarn mindre enn 37 ukers svangerskapsl når det kliniske utfyllet oppveier potensiel risiko. Det er ingen kjent risiko for allergi. Skulle smerten vedvare, fjern der bandasjen og opphør bruken.

Kontraindikasjoner
• Må ikke brukes på pasienter med kjent overfølsomhet for sølv.
• Må ikke brukes på pasienter under MR-undersøkelse (magnetisk resonanstomografi).
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen før strålebehandling. En ny bandasje kan påføres etter hver behandling.
Førholdsregler
• Kun for ekstern bruk. Bandasjen skal for eksempel ikke påføres på eksponerte organer.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke kompatibel med oljebaserte produkter som vaselin.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke nødvendigvis kompatibel med topiske antimikrobielle midler.
• Unngå kontakt med elektroder eller ledende geier under elektroniske målinger, f.eks. EEG og ECG.
• Midlertidig smerte kan opplevs ved påføring av ACTICOAT° Flex 7-bandasjen. Fjern bandasjen hvis vedvarende smerte opplevs etter påføring. For å lindre denne smerten påføres du en ny bandasje og bruker et hydrogelprodukt som absorberer smertefullt risiko. Det er ingen kjent risiko for allergi. Skulle smerten vedvare, fjern der bandasjen og opphør bruken.

Kontraindikasjoner
• Må ikke brukes på pasienter med kjent overfølsomhet for sølv.
• Må ikke brukes på pasienter under MR-undersøkelse (magnetisk resonanstomografi).
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen før strålebehandling. En ny bandasje kan påføres etter hver behandling.
Førholdsregler
• Kun for ekstern bruk. Bandasjen skal for eksempel ikke påføres på eksponerte organer.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke kompatibel med oljebaserte produkter som vaselin.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke nødvendigvis kompatibel med topiske antimikrobielle midler.
• Unngå kontakt med elektroder eller ledende geier under elektroniske målinger, f.eks. EEG og ECG.
• Midlertidig smerte kan opplevs ved påføring av ACTICOAT° Flex 7-bandasjen. Fjern bandasjen hvis vedvarende smerte opplevs etter påføring. For å lindre denne smerten påføres du en ny bandasje og bruker et hydrogelprodukt som absorberer smertefullt risiko. Det er ingen kjent risiko for allergi. Skulle smerten vedvare, fjern der bandasjen og opphør bruken.

Kontraindikasjoner
• Må ikke brukes på pasienter med kjent overfølsomhet for sølv.
• Må ikke brukes på pasienter under MR-undersøkelse (magnetisk resonanstomografi).
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen før strålebehandling. En ny bandasje kan påføres etter hver behandling.
Førholdsregler
• Kun for ekstern bruk. Bandasjen skal for eksempel ikke påføres på eksponerte organer.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke kompatibel med oljebaserte produkter som vaselin.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke nødvendigvis kompatibel med topiske antimikrobielle midler.
• Unngå kontakt med elektroder eller ledende geier under elektroniske målinger, f.eks. EEG og ECG.
• Midlertidig smerte kan opplevs ved påføring av ACTICOAT° Flex 7-bandasjen. Fjern bandasjen hvis vedvarende smerte opplevs etter påføring. For å lindre denne smerten påføres du en ny bandasje og bruker et hydrogelprodukt som absorberer smertefullt risiko. Det er ingen kjent risiko for allergi. Skulle smerten vedvare, fjern der bandasjen og opphør bruken.

Kontraindikasjoner
• Må ikke brukes på pasienter med kjent overfølsomhet for sølv.
• Må ikke brukes på pasienter under MR-undersøkelse (magnetisk resonanstomografi).
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen før strålebehandling. En ny bandasje kan påføres etter hver behandling.
Førholdsregler
• Kun for ekstern bruk. Bandasjen skal for eksempel ikke påføres på eksponerte organer.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke kompatibel med oljebaserte produkter som vaselin.
• ACTICOAT° Flex 7-bandasjen er ikke nødvendigvis kompatibel med topiske antimikrobielle midler.
• Unngå kontakt med elektroder eller ledende geier under elektroniske målinger, f.eks. EEG og ECG.
• Midlertidig smerte kan opplevs ved påføring av ACTICOAT° Flex 7-bandasjen. Fjern bandasjen hvis vedvarende smerte opplevs etter påføring. For å lindre denne smerten påføres du en ny bandasje og bruker et hydrogelprodukt som absorberer smertefullt risiko. Det er ingen kjent risiko for allergi. Skulle smerten vedvare, fjern der bandasjen og opphør bruken.

SE smith&nephew

ACTICOAT° FLEX 7

with SILCRYST° Nanocrystals
Silverbelagt antimikrobiellt barriärförband

Beskrivning
O pensil ACTICOAT° Flex 7 consiste numa camada de políester flexível de baixa aderência revestido de prata nanocristalina. ACTICOAT Flex 7 é um penso que se adapta facilmente aos contornos do corpo para manter o contato com a superfície da ferida. O penso é de baixa aderência o que minimiza o trauma na ferida nas mudanças do penso. A prata nanocristalina proporciona uma barreira antimicrobiana eficaz contra a contaminação microbiana, protegendo a ferida contra microorganismos patogênicos invasores, favorecendo assim uma cicatrização mais rápida. A prata nanocristalina também é eficaz contra microorganismos presentes na ferida. As propriedades da barreira antimicrobiana de ACTICOAT Flex 7 permanecem eficazes durante pelo menos 7 dias.

Bruksanvisning
• Vid behov ska såret tvättas enligt lokala kliniska rutiner. Använd INTE koksalt.
• Ta ut ACTICOAT Flex 7-förbandet från förpackningen med ren teknik.
• Klipp till förbandet efter behov. Om förbandet ska användas med kompressionsbehandling ska förbandet klippas efter sårets storlek.
• Fukta förbandet enligt lokala kliniska rutiner, blöttlägg förbandet helt och hållet och krama det sedan försiktigt. (Använd INTE koksalt). Pressa ut överflödig vätska före applicering. Alternativt kan ett tunt lager hydrogel, t.ex. INTRASITE® Gel, appliceras direkt på såret och/eller på förbandet.
• När förbandet används med NPWT, ska sårfyllningsmaterial fuktas och bytas i enlighet med användningsma från tillverkaren. När ACTICOAT Flex 7-förbandet används vid NPWT, rekommenderas inte användning av hydrogel som t.ex. INTRASITE®.
• Applicera ACTICOAT Flex 7-förbandet utan att sträcka på förbandet med valfri sida upp på sårlåten och se till att inga veck förekommer. Fukt förbandet ska appliceras i sträckningsen riktning längs extremiteten för att möjliggöra rörelse.
• ACTICOAT Flex 7-förbandet kan användas för att packa sår.
• Fast ACTICOAT Flex 7-förbandet på plats med ett lämpligt sekundärt förband eller med kompressionsbehandling som kan upprätthålla en fuktig sårmiljö. Vid kraftigt exsuderande sår är ett absorberande sekundärt förband lämpligt. ACTICOAT Flex 7-förbandet möjliggör sekundera av exsudatet direkt till det sekundära förbandet.
• Håll ACTICOAT Flex 7-förbandet fuktigt, men inte så vått att maceration av vävnad inträffar.
• När ACTICOAT Flex 7-förbandet används med kompression, använd ett förband som absorberar exsudatet direkt till det sekundära förbandet.
• Håll ACTICOAT Flex 7-förbandet fuktigt, men inte så vått att maceration av vävnad inträffar.
• När ACTICOAT Flex 7-förbandet används med kompression, använd ett förband som absorberar exsudatet direkt till det sekundära förbandet.
• Håll ACTICOAT Flex 7-förbandet fuktigt, men inte så vått att maceration av vävnad inträffar.
• När ACTICOAT Flex 7-förbandet används med kompression, använd ett förband som absorberar exsudatet direkt till det sekundära förbandet.

Indikationer
O pensil ACTICOAT° Flex 7 é indicado como penso de barreira antimicrobiana, em feridas de essadura total ou parcial, bem como em queimaduras, lacras cirúrgicas, úlceras de pressão, úlceras venosas e úlceras diabéticas. A penso ACTICOAT Flex 7 pode ser usado em feridas infectadas. Quando o produto for utilizado em feridas infectadas, a infecção deve ser inspecionada e mudado de acordo com o protocolo clínico local. O ACTICOAT Flex 7 pode ser utilizado como camada de contato com a ferida em associação com terapia de feridas por pressão negativa (TFPN) por um período máximo de 3 dias.

Indikationer
• Använd inte produkten på patienter med känt överkänslighet mot silver.
• Använd inte på patienter under MR-undersökning (Magnetisk resonanstomografi).
• Använd inte på patienter under MR-undersökning (Magnetisk resonanstomografi).
• ACTICOAT Flex 7-förbandet före strålbehandling. Ett nytt förband kan påføres efter varje behandling.
Förskriftshetsåtgärder
• Endast för utvärtes bruk, förbandet får t.ex. inte appliceras på exsuderande organer.
• ACTICOAT Flex 7-förbandet är inte kompatibel med oljebaserte produkter som vaselin.
• ACTICOAT Flex 7-förbandet är eventuellt inte kompatibel med topiska antimikrobiella medel.
• Undvik kontakt med elektroder eller elektroder vid elektroniska undersökningar, t.ex. EEG och ECG.
• Övergående smärta kan upplevas vid applicering av ACTICOAT Flex 7-förbandet. Avlägsna förbandet om kontinuerlig smärta skulle uppkomma efter applicering. För att lindra denna smärta, applicera ett nytt förband och använd en hydrogel-produkt som absorberar smärta eller fuktiga sår. Om förbandet beror på mängden exsudat och sårets tillstånd. Förband kan sitta kvar i upp till 7 dagar.
• När ACTICOAT Flex 7-förbandet används med kompression, använd ett förband som absorberar exsudatet direkt till det sekundära förbandet.
• Håll ACTICOAT Flex 7-förbandet fuktigt, men inte så vått att maceration av vävnad inträffar.
• När ACTICOAT Flex 7-förbandet används med kompression, använd ett förband som absorberar exsudatet direkt till det sekundära förbandet.

Indikationer
• Använd inte produkten på patienter med känt överkänslighet mot silver.
• Använd inte på patienter under MR-undersökning (Magnetisk resonanstomografi).
• Använd inte på patienter under MR-undersökning (Magnetisk resonanstomografi).
• ACTICOAT Flex 7-förbandet före strålbehandling. Ett nytt förband kan påføres efter varje behandling.
Förskriftshetsåtgärder
• Endast för utvärtes bruk, förbandet får t.ex. inte appliceras på exsuderande organer.
• ACTICOAT Flex 7-förbandet är inte kompatibel med oljebaserte produkter som vaselin.
• ACTICOAT Flex 7-förbandet är eventuellt inte kompatibel med topiska antimikrobiella medel.
• Undvik kontakt med elektroder eller elektroder vid elektroniska undersökningar, t.ex. EEG och ECG.
• Övergående smärta kan upplevas vid applicering av ACTICOAT Flex 7-förbandet. Avlägsna förbandet om kontinuerlig smärta skulle uppkomma efter applicering. För att lindra denna smärta, applicera ett nytt förband och använd en hydrogel-produkt som absorberar smärta eller fuktiga sår. Om förbandet beror på mängden exsudat och sårets tillstånd. Förband kan sitta kvar i upp till 7 dagar.
• När ACTICOAT Flex 7-förbandet används med kompression, använd ett förband som absorberar exsudatet direkt till det sekundära förbandet.
• Håll ACTICOAT Flex 7-förbandet fuktigt, men inte så vått att maceration av vävnad inträffar.
• När ACTICOAT Flex 7-förbandet används med kompression, använd ett förband som absorberar exsudatet direkt till det sekundära förbandet.

Indikationer
• Använd inte produkten på patienter med känt överkänslighet mot silver.
• Använd inte på patienter under MR-undersökning (Magnetisk resonanstomografi).
• Använd inte på patienter under MR-undersökning (Magnetisk resonanstomografi).
• ACTICOAT Flex 7-förbandet före strålbehandling. Ett nytt förband kan påføres efter varje behandling.
Förskriftshetsåtgärder
• Endast för utvärtes bruk, förbandet får t.ex. inte appliceras på exsuderande organer.
• ACTICOAT Flex 7-förbandet är inte kompatibel med oljebaserte produkter som vaselin.
• ACTICOAT Flex 7-förbandet är eventuellt inte kompatibel med topiska antimikrobiella medel.
• Undvik kontakt med elektroder eller elektroder vid elektroniska undersökningar, t.ex. EEG och ECG.
• Övergående smärta kan upplevas vid applicering av ACTICOAT Flex 7-förbandet. Avlägsna förbandet om kontinuerlig smärta skulle uppkomma efter applicering. För att lindra denna smärta, applicera ett nytt förband och använd en hydrogel-produkt som absorberar smärta eller fuktiga sår. Om förbandet beror på mängden exsudat och sårets tillstånd. Förband kan sitta kvar i upp till 7 dagar.
• När ACTICOAT Flex 7-förbandet används med kompression, använd ett förband som absorberar exsudatet direkt till det sekundära förbandet.

Indikationer
• Använd inte produkten på patienter med känt överkänslighet mot silver.
• Använd inte på patienter under MR-undersökning (Magnetisk resonanstomografi).
• Använd inte på patienter under MR-undersökning (Magnetisk resonanstomografi).
• ACTICOAT Flex 7-förbandet före strålbehandling. Ett nytt förband kan påføres efter varje behandling.
Förskriftshetsåtgärder
• Endast för utvärtes bruk, förbandet får t.ex. inte appliceras på exsuderande organer.
• ACTICOAT Flex 7-förbandet är inte kompatibel med oljebaserte produkter som vaselin.
• ACTICOAT Flex 7-förbandet är eventuellt inte kompatibel med topiska antimikrobiella medel.
• Undvik kontakt med elektroder eller elektroder vid elektroniska undersökningar, t.ex. EEG och ECG.
• Övergående smärta kan upplevas vid applicering av ACTICOAT Flex 7-förbandet. Avlägsna förbandet om kontinuerlig smärta skulle uppkomma efter applicering. För att lindra denna smärta, applicera ett nytt förband och använd en hydrogel-produkt som absorberar smärta eller fuktiga sår. Om förbandet beror på mängden exsudat och sårets tillstånd. Förband kan sitta kvar i upp till 7 dagar.
• När ACTICOAT Flex 7-förbandet används med kompression, använd ett förband som absorberar exsudatet direkt till det sekundära förbandet.

Indikationer
• Använd inte produkten på patienter med känt överkänslighet mot silver.
• Använd inte på patienter under MR-undersökning (Magnetisk resonanstomografi).
• Använd inte på patienter under MR-undersökning (Magnetisk resonanstomografi).
• ACTICOAT Flex 7-förbandet före strålbehandling. Ett nytt förband kan påføres efter varje behandling.
Förskriftshetsåtgärder
• Endast för utvärtes bruk, förbandet får t.ex. inte appliceras på exsuderande organer.
• ACTICOAT Flex 7-förbandet är inte kompatibel med oljebaserte produkter som vaselin.
• ACTICOAT Flex 7-förbandet är eventuellt inte kompatibel med topiska antimikrobiella medel.
• Undvik kontakt med elektroder eller elektroder vid elektroniska undersökningar, t.ex. EEG och ECG.
• Övergående smärta kan upplevas vid applicering av ACTICOAT Flex 7-förbandet. Avlägsna förbandet om kontinuerlig smärta skulle uppkomma efter applicering. För att lindra denna smärta, applicera ett nytt förband och använd en hydrogel-produkt som absorberar smärta eller fuktiga sår. Om förbandet beror på mängden exsudat och sårets tillstånd. Förband kan sitta kvar i upp till 7 dagar.
• När ACTICOAT Flex 7-förbandet används med kompression, använd ett förband som absorberar exsudatet direkt till det sekundära förbandet.

Indikationer
• Använd inte produkten på patienter med känt överkänslighet mot silver.
• Använd inte på patienter under MR-undersökning (Magnetisk resonanstomografi).
• Använd inte på patienter under MR-undersökning (Magnetisk resonanstomografi).
• ACTICOAT Flex 7-förbandet före strålbehandling. Ett nytt förband kan påføres efter varje behandling.
Förskriftshetsåtgärder
• Endast för utvärtes bruk, förbandet får t.ex. inte appliceras på exsuderande organer.
• ACTICOAT Flex 7-förbandet är inte kompatibel med oljebaserte produkter som vaselin.
• ACTICOAT Flex 7-förbandet är eventuellt inte kompatibel med topiska antimikrobiella medel.
• Undvik kontakt med elektroder eller elektroder vid elektroniska undersökningar, t.ex. EEG och ECG.
• Övergående smärta kan upplevas vid applicering av ACTICOAT Flex 7-förbandet. Avlägsna förbandet om kontinuerlig smärta skulle uppkomma efter applicering. För att lindra denna smärta, applicera ett nytt förband och använd en hydrogel-produkt som absorberar smärta eller fuktiga sår. Om förbandet beror på mängden exsudat och sårets tillstånd. Förband kan sitta kvar i upp till 7 dagar.
• När ACTICOAT Flex 7-förbandet används med kompression, använd ett förband som absorberar exsudatet direkt till det sekundära förbandet.

PT smith&nephew

ACTICOAT° FLEX 7

with SILCRYST° Nanocrystals
Penso barreira antimicrobiana revestido por prata

Descrição
O pensil ACTICOAT° Flex 7 consiste numa camada de políester flexível de baixa aderência revestido de prata nanocristalina. ACTICOAT Flex 7 é um penso que se adapta facilmente aos contornos do corpo para manter o contato com a superfície da ferida. O penso é de baixa aderência o que minimiza o trauma na ferida nas mudanças do penso. A prata nanocristalina proporciona uma barreira antimicrobiana eficaz contra a contaminação microbiana, protegendo a ferida contra microorganismos patogênicos invasores, favorecendo assim uma cicatrização mais rápida. A prata nanocristalina também é eficaz contra microorganismos presentes na ferida. As propriedades da barreira antimicrobiana de ACTICOAT Flex 7 permanecem eficazes durante pelo menos 7 dias.

Instruções de utilização
• Quando necessário, a limpeza da ferida deve ser efetuada de acordo com o protocolo clínico local. NÃO usar solução salina.
• Retirar o penso ACTICOAT Flex 7 da embalagem utilizando uma técnica limpa.
• Cortar o penso na forma desejada conforme necessário. Quando usado com terapia de compressão, o penso deve ser cortado do tamanho da ferida.
• Humedecer o penso de acordo com o protocolo clínico local, submergindo completamente o penso e depois apertando suavemente. (NÃO usar solução salina). Permita que a água em excesso escorra da superfície total ou parcial, bem como em queimaduras, lacras cirúrgicas, úlceras de pressão, úlceras venosas e úlceras diabéticas. A penso ACTICOAT Flex 7 pode ser usado em feridas infectadas. Quando o produto for utilizado em feridas infectadas, a infecção deve ser inspecionada e mudado de acordo com o protocolo clínico local. O ACTICOAT Flex 7 pode ser utilizado como camada de contato com a ferida em associação com terapia de feridas por pressão negativa (TFPN) por um período máximo de 3 dias.

Indicações
ACTICOAT Flex 7 está indicado como penso de barreira antimicrobiana, em feridas de essadura total ou parcial, bem como em queimaduras, lacras cirúrgicas, úlceras de pressão, úlceras venosas e úlceras diabéticas. A penso ACTICOAT Flex 7 pode ser usado em feridas infectadas. Quando o produto for utilizado em feridas infectadas, a infecção deve ser inspecionada e mudado de acordo com o protocolo clínico local. O ACTICOAT Flex 7 pode ser utilizado como camada de contato com a ferida em associação com terapia de feridas por pressão negativa (TFPN) por um período máximo de 3 dias.

Contraindicações
• Não use em pacientes com sensibilidade conhecida à prata.
• Não use em pacientes durante exames de MRI (Imagiológica por Ressonância Magnética).
• Antes da administração de terapia de radiação, remova o penso ACTICOAT Flex 7. Após cada tratamento pode ser aplicado um novo penso.

Precauções
• Apenas para uso externo, por exemplo não aplique o penso em órgãos expostos.
• ACTICOAT Flex 7 não é compatível com produtos à base de óleo, tais como vaselina.
• ACTICOAT Flex 7 pode não ser compatível com antimicrobianos tópicos.
• Mantenha o penso ACTICOAT Flex 7 seco e seco. O produto pode ser usado em feridas por pressão negativa (TFPN) por um período máximo de 3 dias.
• Mude o penso dependendo da quantidade de exsudado presente e do estado da ferida. Os pensos podem permanecer na ferida até 7 dias.
• Ao usar ACTICOAT Flex 7 sob compressão, verifique periodicamente todo o sistema do penso e mude somente quando transbordar o penso. Pode ser necessário um penso absorvente não oclusivo adicional se o nível de exsudado for elevado.
• Se o penso estiver ou aderir à ferida, tente removê-lo com cuidado. Se necessário, use uma pinça para auxiliar a remoção e evitar a interrupção da cicatrização da ferida.

Nota: ACTICOAT Flex 7 pode causar descoloração transitória da pele circundante. **Nota:** A cor do penso pode variar. Isto não afeta o desempenho do penso.

Disponibilidade do Produto
Código Tamanho Boyut
66800395 5cm x 5cm / 2in. x 2in. 51u Kuto
66800397 10cm x 12.5cm / 4in. x 5in. 51u Kuto
66800420 15cm x 15cm / 6in. x 6in. 51u Kuto
66800400 20cm x 40cm / 8in. x 16in. 61u Kuto
66800401 40cm x 40cm / 16in. x 16in. 61u Kuto
66800545 2.5cm x 60cm / 1in. x 24in. 51u Kuto

Disponibilidade do Produto
Código Tamanho Boyut
66800395 5cm x 5cm / 2in. x 2in. 51u Kuto
66800397 10cm x 12.5cm / 4in. x 5in. 51u Kuto
66800420 15cm x 15cm / 6in. x 6in. 51u Kuto
66800400 20cm x 40cm / 8in. x 16in. 61u Kuto
66800401 40cm x 40cm / 16in. x 16in. 61u Kuto
66800545 2.5cm x 60cm / 1in. x 24in. 51u Kuto

Disponibilidade do Produto
Código Tamanho Boyut
66800395 5cm x 5cm / 2in. x 2in. 51u Kuto
66800397 10cm x 12.5cm / 4in. x 5in. 51u Kuto
66800420 15cm x 15cm / 6in. x 6in. 51u Kuto
66800400 20cm x 40cm / 8in. x 16in. 61u Kuto
66800401 40cm x 40cm / 16in. x 16in. 61u Kuto
66800545 2.5cm x 60cm / 1in. x 24in. 51u Kuto

Disponibilidade do Produto
Código Tamanho Boyut
66800395 5cm x 5cm / 2in. x

