


+ ALLEVYN[®] Ag Apósitos de Espuma Antimicrobianos

Puedes confiar para ayudar a gestionar la infección y los cuidados¹⁻⁵



Smith+Nephew

ALLEVYN[®] Ag
ADHESIVE

Apósitos de Espuma Antimicrobiano

ALLEVYN[®] Ag
NON-ADHESIVE

Apósitos de Espuma Antimicrobiano

ALLEVYN[®] Ag
GENTLE BORDER

Apósitos de Espuma Antimicrobiano

www.smith-nephew.com/es-es/

NIVEL DE EXUDADO	INDICACIONES PRIMARIAS	OTRAS INDICACIONES
 ABSORCIÓN MODERADA A ALTA	 ZONAS DONANTES*	ÚLCERAS DE PIERNA
 ABSORCIÓN MODERADA	 QUEMADURAS	ÚLCERAS DEL PIE DIABÉTICO
	 DEHISCENCIAS DE HERIDAS QUIRÚRGICAS	HERIDAS FÚNGICAS Y MALIGNAS
		LESIONES POR PRESIÓN

*Excluyendo el apósito ALLEVYN Ag ADHESIVE

Gama **ALLEVYN** con la actividad antimicrobiana añadida de la plata,^{*1,2,4} la gama **ALLEVYN Ag** está diseñada para la comodidad del paciente cuando la infección es una preocupación⁶⁻⁹

Características y beneficios

Gama ALLEVYN: absorbente, protectora y suave

Los apósitos de espuma ALLEVYN son **absorbentes**,¹⁰⁻¹² **protectores**^{10,13} y **suave**,^{14,15} haciendo lo básico que esperas de un apósito y más.



Signos + síntomas de infección

Los apósitos de plata, como los apósitos ALLEVYN Ag, deben usarse cuando se identifican signos y síntomas de infección.¹⁶ Por ejemplo:



- Dolor nuevo o en aumento
- Aumento del mal olor
- Calor local

Apósitos de espuma antimicrobianos ALLEVYN Ag

Liberación sostenida de plata

- Proporciona acción antimicrobiana hasta 7 días^{1,2,17}
- Erradica los organismos patógenos que se encuentran en las heridas para reducir el riesgo de colonización e infección^{2,4,18}
- Minimiza las bacterias que causan el mal olor de la herida^{2,19}
- Minimiza la carga bacteriana que causa el aumento de los niveles de metaloproteinasas de la matriz (MMP) en la herida y de la inflamación.^{1,2,17,20}



*Como se demostró in vivo. †Como se demostró in vitro. ‡Debido a sus propiedades no adherentes.

Escanee para obtener más información sobre la gama de apósitos ALLEVYN Ag



ALLEVYN Ag ADHESIVE

Adhesión segura para ayudar a mantener el apósito en su lugar sin adherirse a la herida^{21,22}

ALLEVYN Ag ADHESIVE

Apósitos de Espuma Antimicrobiano



Código	Tamaño	Un.
66800072	7.5cm x 7.5cm	10
66800074	10cm x 10cm	10
66800076	12.5cm x 12.5cm	10
66800080	17.5cm x 17.5cm	10
66800092	Sacrum Pequeño 17cm x 17cm	10
66800095	Sacrum Grande 22cm x 22cm	10

ALLEVYN Ag NON-ADHESIVE

- Apto para **pieles frágiles** y se adapta a los **contornos corporales** sin adherirse a la herida^{6,7,23,24}
- Adecuado para uso con **compresión**^{25,26}

ALLEVYN Ag NON-ADHESIVE

Apósitos de Espuma Antimicrobiano



Código	Tamaño	Un.
66800084	10cm x 10cm	10
66800087	15cm x 15cm	10
66800090	20cm x 20cm	10
66800098	Heel 10.5cm x 13.5cm	5

ALLEVYN Ag GENTLE BORDER

- Se adapta a **áreas difíciles del cuerpo** como las rodillas y los talones⁹
- Adecuado para **pieles frágiles**²⁷

ALLEVYN Ag GENTLE BORDER

Apósitos de Espuma Antimicrobiano



Código	Tamaño	Un.
66800436	7.5cm x 7.5cm	10
66800437	10cm x 10cm	10
66800438	12.5cm x 12.5cm	10
66800439	17.5cm x 17.5cm	10

Para obtener información detallada sobre el producto, incluidas las indicaciones de uso, las contraindicaciones, las advertencias y las precauciones, consulte las Instrucciones de uso (IFU) del producto antes de usarlo.

Referencias: 1. S+N 2007. Internal Report DOF 0703014. 2. S+N 2009. Internal Report RRWMP07330-10-03. 3. S+N. PMS 329 ALLEVYN Ag Gentle Border: PMCF ACTIVITY SUMMARY REPORT, Version 02. 4. S+N 2007. Internal Report DOF 0703006. 5. Kotz P, Fisher J, McCluskey P, Hartwell SD, Dharma H. *International Wound Journal*, 2009;6(3):186-194. 6. Foster AV, Greenhill MT, Edmonds ME. *Journal of Wound Care*, 1994;3(5):224-228. 7. Kurring PA, Roberts CD, Quinlan D. *British Journal of Nursing*, 1994;3(20):1049-1050, 1052-1043. 8. S+N 2008. Internal Report SR/ CIME/009. 9. S+N 2008. Internal Report HVT050/ST788. 10. S+N 2017. Internal Report DS/16/424/R V3. 11. S+N 2009. Internal Report DS/09/013/R7. 12. S+N 2007. Internal Report DOF 0702001. 13. Forni C, Gaziano D, Allegrini E, et al. *International Journal of Nursing Studies*, 2022;127:104172. 14. Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. *Wounds UK*, 2009;5(3):32-44. 15. S+N 2022. Post Market Clinical Follow-Up (PMCF) Report for ALLEVYN GENTLE. CSD.AWM.22.050. 16. International Wound Infection, Institute (IWII) Wound Infection in Clinical Practice. *Wounds International*. 2022. 17. S+N 2007. Internal Report DOF 0703003. 18. S+N 2007. Internal Report DOF 0703007. 19. Vaughan K, Woodmansey, E. In: Internal Statement: Smith+Nephew, 2011. 20. S+N 2018. Internal Statement. EOAWM.PCSgen.003.v1. 21. Bale S, Squires D, Varmon T, et al. *Journal of Wound Care*, 1997;6(10):463-466. 22. Martini L, Brandani P, et al. *Journal of Wound Care*, 1999;8(9):457-460. 23. Leonard S, McCluskey P, Butters V, Winter R, Smith G. *Wounds UK*, 2009;5(1):17-26. 24. S+N 2006. Internal Report CER/CE/022/ANA. 25. S+N 2018. Internal Report DS/18/264/R. 26. Franks PJ, Moody M, Moffatt CJ, et al. *Wound Repair and Regeneration*, 2007;15(2):197-202. 27. S+N 2010. Internal Report OR-DOF/011.