

# 3.500 millones de horas en 2030: ¿Cómo se ha calculado?

**Resumen de la publicación:** Moore Z, et al. Wounds International (2022)\*  
Wounds International publicó '3.500 millones de horas de tiempo de enfermería liberadas para 2030: Aumento potencial de la eficiencia de los cuidados compartidos y los apósitos de espuma avanzados de uso prolongado'. La metodología de la conclusión central del artículo se muestra a continuación. Este cálculo se elaboró a partir de evidencia y datos publicados y fue verificado por un panel mundial de enfermería.

## Número de enfermeras en todo el mundo

A través de entornos agudos y comunitarios, utilizando datos de la OMS.



1



2

**Importancia de la especialidad de la enfermera** Limitación a las enfermeras que tratan habitualmente heridas crónicas.

3



## Horas de trabajo de las enfermeras


La media de tiempo total de trabajo, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es de 38,5 horas semanales, teniendo en cuenta el trabajo a tiempo completo y a parcial.

4

## Heridas crónicas

Restringir el modelo solo en las heridas crónicas, que representan el 48% de todas las heridas.

48%




5



## Aplicar eficiencias clínicas

Los apósitos de espuma avanzados de uso prolongado que favorecen una cicatrización sin interrupciones pueden reducir el tiempo que suponen a los cambios de apósito en al menos un 29%.



6

## Tiempo dedicado al cambio de apósitos

El 50% del tiempo de enfermería comunitaria se dedica al tratamiento de heridas. Calcular el tiempo comunitario y escalar el tiempo total para incluir el cuidado de heridas en el entorno clínico.

9



## Relevancia del mercado

Retirada del estudio las enfermeras en regiones cuya infraestructura sanitaria no se alineaba a las prácticas de cuidados compartidos.

7



25%

8

**Compensar otros factores** Aplicar una reducción del 25% para tener en cuenta otros factores, incluidos los índices actuales de adopción en todo el mundo de apósitos de espuma avanzados de uso prolongado.

## 3.500 millones de horas liberadas en todo el mundo en 2030

Este ahorro anual brinda la oportunidad de liberar hasta 3.500 millones de horas de tiempo de enfermería a nivel mundial para 2030.

10

