

Riepilogo della pubblicazione: Tiscar-González V, et al. Adv Skin Wound Care, Jan (2021)*

Il passaggio alla medicazione in schiuma ALLEVYN® LIFE ha contribuito alla riduzione di cambi e dei costi settimanali delle medicazioni. Inoltre ha migliorato la soddisfazione generale del trattamento.

+ Vantaggi

Rispetto alle medicazioni precedenti, ALLEVYN LIFE:

1,48

Cambi di medicazione in meno per paziente a settimana
(1,66 vs 3,14; p <0,001)

58,7%

Riduzione dei costi medi settimanali delle medicazioni per paziente
(€ 27,75 vs € 11,46; p <0,001)

Maggiore soddisfazione durante il trattamento per clinici e pazienti



Sommario

- Uno studio osservazionale (retrospettivo e prospettico) condotto in 24 centri di assistenza primaria e 6 centri sanitari in Spagna
- La medicazione ALLEVYN LIFE è stata utilizzata come medicazione primaria (35,2%) o secondaria (64,8%) per 4 settimane al posto delle precedenti medicazioni (schiume, 42,0%; fibre gelificanti, 21,0%)

- Sono stati inclusi 94 pazienti con 128 ferite e la maggior parte aveva un'età >70 anni (75,8%)
- Le lesioni più frequenti sono state ulcere degli arti inferiori (39,8%) o lesioni da pressione (31,3%)
Il 25% di tutte le ferite aveva una durata >12 mesi.

Risultati

- Alla 4ª settimana, rispetto alle medicazioni precedenti, la medicazione ALLEVYN LIFE ha contribuito a ridurre significativamente:
 - La frequenza media di cambio medicazione settimanale del 47,1% (Figura; p <0,001)
 - I cambi di medicazione di routine delle 'medicazioni saturate' o 'sporche' sono stati ridotti del 50%
 - Il costo settimanale medio delle medicazioni del 58,7% (Figura; p<0,001)
- Riduzione dell'area della ferita del 28,3% mediante l'uso di ALLEVYN LIFE; da 9,9cm² fino a 7,1cm² (p<0,001)
 - Nel 68,3% delle ferite l'area è stata ridotta (>30% per l' 85,9% delle ferite)
- In base alle caratteristiche valutate, la maggior parte dei clinici concorda nel reputare ALLEVYN LIFE più efficace rispetto a quanto precedentemente utilizzato (media 69%; 7 caratteristiche)
- La soddisfazione dei pazienti, rispetto alla valutazione iniziale basata sull'uso della medicazione precedentemente utilizzata, ha visto un aumento dei valori buono-molto buono del 44,7% per la gestione complessiva, del 46,1% per la gestione dell'essudato e del 47% per il confort in seguito all'utilizzo di ALLEVYN LIFE.




Figura. Costo medio settimanale delle medicazioni per paziente con ALLEVYN LIFE e con quelle precedenti, così come la frequenza media di cambio settimanale delle medicazioni.

Conclusioni

Se comparato alle medicazioni precedentemente utilizzate, l'uso di ALLEVYN LIFE in un contesto di assistenza domiciliare ha contribuito a ridurre significativamente sia la frequenza di cambio delle medicazioni sia i costi e ha migliorato la soddisfazione dei clinici e dei pazienti.

Per ottenere informazioni dettagliate sul prodotto, incluse le indicazioni d'uso, controindicazioni, precauzioni e avvertenze, consultare le istruzioni d'uso (IFU) relative al prodotto prima dell'utilizzo.

Referenze

* Tiscar-González V, Menor-Rodríguez MJ, Rabadán-Sainz C, et al. Clinical and economic impact of wound care using a polyurethane foam multi-layer dressing versus standard dressings on delayed healing ulcers. Adv Skin Wound Care. 2021;34(1):23-30.