Uma rota para uma gestão mais efetiva da infeção

Melhorar os resultados dos pacientes¹ com uma tomada de decisão precisa, uma resposta rápida e opções de tratamento efetivas

T.I.M.E.
Ferramenta Apoio Decisão Clínica

A

B

C

D

E

Começar com os seguintes passos para realizar uma avaliação integral²

A Avaliar o paciente, o bem-estar e a ferida

B Integrar uma equipa multidisciplinar para promover cuidados holísticos ao paciente

C Controlar ou tratar as causas subjacentes e as barreiras à cicatrização

D Decidir o tratamento adequado

E Avaliar e reavaliar os resultados do tratamento e da gestão das feridas

Que sinais e sintomas clínicos de infeção estão presentes?*

<div style="display: flex;"> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p>Biofilme^{1,3-5}</p> <ul style="list-style-type: none"> Falha do tratamento antibiótico/antimicrobiano Recorrência no atraso da cicatrização ao suspender o tratamento antibiótico Atraso na cicatrização apesar de uma gestão óptima da ferida/paciente Nível reduzido de inflamação crónica Nível reduzido de eritema Granulação friável Sinais encobertos (subtis) de infeção </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p>Encobertos (subtis)^{1,3}</p> <ul style="list-style-type: none"> Atraso na cicatrização da ferida Drenagem serosa com inflamação recorrente Hipergranulação Granulação friável, sangrante Pontes epiteliais e bolsas no tecido de granulação Deterioração e alargamento da ferida Aparecimento ou aumento da dor Aumento do mau odor </div> </div>	<div style="display: flex;"> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p>Evidentes (clássicos)^{1,3}</p> <ul style="list-style-type: none"> Eritema Calor Edema/inchaço Drenagem purulenta Dor Aumento do mau odor Atraso na cicatrização da ferida </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p>Infeção estendida ou sistémica^{1,3}</p> <ul style="list-style-type: none"> Eritema estendido, calor Pode incluir celulite, crepitação Deterioração/deiscência da ferida com ou sem lesões satélite Mal-estar/letargia Perda de apetite Resposta inflamatória sistémica Sépsis Disfunção orgânica </div> </div>
---	---

Cuidado das feridas baseado no Biofilme^{4,5}

- Desbridamento agressivo repetitivo e limpeza[†] de acordo com o protocolo local
- Tratar a suspeita de biofilme com Cadexómero de iodo 0.9% Gama **IODOSORB[®]** 7-9Ω
- Reavaliar a intervalos regulares de acordo com o protocolo local e o uso adequado de antimicrobianos. **Tratamento mínimo de duas semanas – Pode necessitar mais tempo que o tratamento da infeção local clássica devido à natureza persistente do biofilme**

Tratamento da infeção local na ferida^{1,3,6}

- Desbridamento e limpeza[†] de acordo com o protocolo local
- Tratamento local da carga microbiana e da infeção com o penso antimicrobiano **ACTICOAT[®]** 10
- Reavaliar a intervalos regulares de acordo com o protocolo local e seguir **os princípios do desafio das duas semanas⁶**

Tratamento da infeção estendida ou sistémica

- Referenciar ao especialista adequado
- Amostra de tecido para cultivo e sensibilidade
- Antibióticos sistémicos segundo protocolo local

Os sinais e sintomas de biofilme/ infeção encoberta foram resolvidos?

Sim

Não

Realizar uma reavaliação integral usando a abordagem, **A B C D E gerir os fatores do hospedeiro e referenciar ao especialista adequado**

Os sinais e sintomas de infeção local foram resolvidos?

Não

Sim

A ferida continua estagnada?

Sim, suspeita de biofilme

Não

Usar o tratamento convencional (isto é, pensos sem antimicrobianos) ou terapias avançadas até à cicatrização (seguir o protocolo local)⁵

DESAFIO DAS DUAS SEMANAS^{1,6}	<p>Recomenda-se que os pensos antimicrobianos sejam usados por um período mínimo de duas semanas. Após as duas semanas, reavaliar e/ou:</p> <ol style="list-style-type: none"> Descontinuar se os sinais e sintomas da infeção estiverem resolvidos. Continuar com o antimicrobiano se a ferida estiver a progredir mas ainda houver sinais e sintomas. Considerar um antimicrobiano alternativo e referenciar a um especialista adequado se não melhorar.
---	---

* Nenhum sinal ou sintoma pode confirmar de forma fiável a presença de infeção e pessoas com imunossupressão podem não apresentar sinais e sintomas de infeção clínica.
[†] Limpar completamente a ferida e a pele em redor da mesma. Se um antisséptico de limpeza for selecionado, as instruções de uso do produto (IFU) e o tempo de permanência devem ser seguidos.
^Ω A menos que o iodo seja contraindicado.
[∞] Para pacientes e feridas de risco muito elevado (ex. osteomielite), pode ser adequado utilizar um tratamento antimicrobiano durante mais tempo do que o desafio das duas semanas.
 Para obter informações detalhadas sobre o produto, incluindo indicações de utilização, contra-indicações, precauções e advertências, consulte as instruções de utilização (IFU) do produto.

Referências 1. International Wound Infection Institute (IWII) Wound infection in clinical practice. Wounds International (2016). 2. Moore Z, et al. J Wound Care 28(3):154-161 (2019). 3. Weir D, Schultz G. Assessment and Management of Wound-Related Infections. In Doughty D & McNichol L (Eds.). Wound, Ostomy and Continence Nurses Society Core Curriculum: Wound Management (p. 156-180). 2016. Philadelphia: Wolters-Kluwer. 4. Wolcott RD, et al. J Wound Care 19(2): 45-53 (2010). 5. Schultz G, et al. Wound Repair Regen 25(5): 744-757 (2017). 6. Ayello EA, et al. Wounds Int 1-24 (2012). 7. Roche ED, et al. Int Wound J 1-10 (2019). 8. Malone M, et al. J Antimicrob Chemother 72, 2093-2101 (2017). 9. Schwarzer S, et al J Infect 80(3):261-270 (2020). 10. Gago M, Garcia F, Gaztelu V, Verdu J, Lopez P, Nolasco A. A comparison of three silver-containing dressings in the treatment of infected, chronic wounds. Wounds. 2008;20(10):273-278.
 Fotografias (da esquerda para a direita) cortesia de Kerlyn Carville, Kevin Woo e Henri Post.
 ◊ Marca registada da Smith+Nephew. Todas as marcas reconhecidas ©Outubro- 25993-pt V3 IM Poster 1024